ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ПРОФИЛАКТИКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ»

Младенческий возраст - период от рождения ребёнка до 1 года - один из наиболее критичных периодов жизни ребенка. Этот период связан с адаптацией ребенка к условиям внешней среды.

Синдром внезапной смерти младенца (СВСМ) - это не заболевание и не болезненное состояние. Тот факт, что это случается без предупреждения, без каких-либо предпосылок, делает синдром внезапной смерти младенца тяжелым, невыносимым испытанием для родителей.

Родители могут существенно снизить риск СВСМ, соблюдая простые правила безопасного сна младенца, а также снизить риск смерти от внешних причин, таких как удушение, закупорка дыхательных путей, застревание головы ребенка между разными предметами, утопление при купании, безопасность в автомобиле и т.д.

Правила, которые необходимо соблюдать родителям:

1.Кладите ребенка спать на спину, с поворотом головы в сторону! Если ваш ребенок уже достаточно окреп, чтобы самостоятельно поворачиваться на живот, не беспокойтесь об этом во время его сна. Достаточно убедиться, что в колыбели или кроватке, где спит ребёнок, нет никаких мягких предметов, в которые ребенок может уткнуться лицом (подушка, мягкие игрушки)!



- 2.Совместный сон с ребенком несет в себе чрезвычайно высокий риск СВСМ или удушения ребенка!
- 3. Не кормите ребенка грудью лежа в постели, это может привести к «присыпанию» закрытию дыхательных путей грудью матери!
- грудью матери!
 4. Не оставляйте ребенка надолго спящим на машинном сидении, в коляске, детских качелях, надувных сиденьях,
- переносках для младенцев, слингах. Если ваш ребенок в слингах или специальной переноске, убедитесь, что его нос и рот свободны и не прижаты к вашему телу или одежде!
- 5. Спите в одной комнате, но не в одной кровати!
- 6. Не перегревайте и не переохлаждайте своего ребенка!
- 7. Не употребляйте алкоголь и запрещенные вещества!





- 8. Берегите ребенка от сигаретного дыма!
- 9. Вакцинируйте ребенка!
- 10. Кормите грудью, если можете. Исключительно грудное вскармливание в течение 4-6 месяцев снижает этот риск СВСМ примерно на 70%!

11.Обучитесь правильному прикладыванию к груди у

специалистов по грудному вскармливанию!

- 12. Проводите профилактику механической асфиксии ребенка, причиной которого может быть срыгивание, неправильное положение во время сна, аспирация рвотными массами!
- 13. Соблюдайте правила гигиены во время ухода за новорожденным, это способствует профилактике инфицирования кожи младенца и пупочной ранки!



- 14. Следите за основными параметрами состояния ребенка: дыхание, температура тела, беспокойство, жалобный или раздражительный плач, состояние кожи и слизистых покровов, изменение активности ребенка!
- 15. Не допускайте контакта с членами семьи, больными простудными или инфекционными заболеваниями (насморком, кашлем, болью в горле, диареей, сыпью на теле, с повышением

температуры)!



- 16. Безопасность в автомобиле. Если Вы планируете перевозить Вашего ребенка в автомобиле, обязательно используйте специальную люльку для перевозки младенцев, это защитит Вашего ребенка от травм в случае автомобильной аварии!
- 17. Никогда не оставляйте ребенка одного без присмотра в автомобиле даже если Вы планируете отойти ненадолго, возьмите ребенка с собой!
- 18. Безопасность при купании. В последнее время участились случаи смерти детей от утопления во время купания. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время купания!
- 19. При любых признаках какого-либо заболевания у ребенка обращайтесь к педиатру, т.к. любое заболевание может быть пусковым фактором синдрома внезапной смерти!
- 20. Четко выполняйте все назначения и рекомендации врача, при направлении на госпитализацию, не оспаривайте мнение врача!



Берегите своего малыша, ведь жизнь бесценна!!!

г. Чита ул. Коханского, 16 Центр охраны здоровья семьи и репродукции <u>www.zkpc-chita.ru</u> тел: (3022) 28-38-95 доб. 3